



Web Contents



2024년 05월 02일 17시 03분

비브리오패혈증 주의!!!

2010.06.15 조희수 193 탐당부서 보건사업과

최근 도내 지역 해수온도 증가 등 비브리오패혈증균이 증식할 환경이 크게 조성되어 환자발생이 우려되고 있습니다. 여름철 어패류는 가급적 60도 이상으로 가열처리하여 섭취하시기 바랍니다

0 잠복기 : 20~48시간

0 전파경로 : 오염된 어패류를 생식하거나 상처난 피부가 오염된 바닷물에 접촉할때 감염

0 고위험군 : 간질환자(만성간염, 간경화, 간암), 알코올중독자, 당뇨 등 면역저하환자

0 급성발열, 혈압저하, 복통, 구토, 설사 등의 증상이 동반되고 발열후 36시간 정도 지나면

피부 병변이 발생

0 피부병변은 주로 하지에서 시작하며 병변모양은 발진, 부종으로 시작하여

수포 또는 출혈성 수포를 형성한 후 점차 범위가 확대되고 괴사성 병변으로 진행

0 고위험군은 어패류 생식을 금한다

0 피부상처가 있는 사람은 오염된 바닷물과 접촉을 자제한다

0 여름철 어패류는 가급적 5도이하로 저온저장하거나 60도 이상으로 가열처리하여 섭취

저온 처리된 생선회는 안전합니다!

5℃이하에서 2시간 증식 중지

비브리오패혈증 예방요령

- 간질환자 등 고위험군은 어패류 생식을 삼가고 끓인 후 먹을 것
- 여름철 해산물은 흐르는 수돗물에 씻은 후 손질할 것
- 도마, 칼 등은 끓인 물에 소독하거나 흐르는 물에 씻을 것
- 바닷가 작업사에는 장화, 고무장갑 등 보호구 착용
- 해수욕장 등에서 상처를 입었을 때 깨끗한 물에 씻고 소독 조치
- 다음의 위험계통은 5~10일까지 어패류 생식을 삼가고 피부상처감염 주의

만성간염, 간염, 간경화, 습관성 음주자는 5~10월까지 해산물을 날로 먹지 말고 끓여서 먹습니다!

비브리오패혈증이 의심되면 즉시 보건소나 의료기관에 방문하여 진료를 받으십시오.

전라남도 Jeolla Namdo

비브리오패혈증 예방

여름철 비브리오패혈증, 흐르는 수돗물에 30초만 씻어도 예방됩니다.

30초면 OK!!

전라남도 Jeolla Namdo

비브리오패혈증 수돗물에 씻기만해도 예방할 수 있습니다.

- 원인균**
 - 비브리오 콜레라균(Vibrio Cholerae)
 - 비브리오 살모넬라균(Vibrio Parahaemolyticus)
- 감염경로**
 - 패혈증 : 오염된 어패류를 익히지 않고 섭취
 - 장상장염 : 연안권에 오염된 해수가 상처 부위에 침입
- 잠복기**
 - 패혈증 : 24~48 시간
 - 장상장염 : 12시간
- 주요증상**
 - 패혈증 : 발열, 오한, 구토, 전신쇠약, 설사, 지푸름, 만상출혈, 수포, 궤양, 괴사
 - 장상장염 : 장상부위 괴종, 홍반, 수포성 괴사 등
- 고위험군**
 - 간질환자, 알코올중독자, 만성질환자, 위염, 위궤양, 위암, 위암예방접종 실패자, 복수비장, 호르몬제나 항암제 복용중인 자, 저산소혈증, 빈혈, 위성염, 백혈병환자, 면역결핍증 환자, AIDS, 백혈구감소증

이것만 주의하시면 비브리오패혈증 예방할 수 있습니다.

비브리오패혈증 예방요령

- 비브리오 패혈증 균은 40℃이상 고온에서 사멸하므로, 장생육과 단장 생선은 수증기를 익혀 드세요.
- 바닷가, 강변, 해수욕장 등에서 수돗물에 씻은 후 30초간 손 씻기를 꼭 하세요.
- 가정용 생선(생선)은 5도 이하로 저온 저온 보관하세요.
- 관내 오염된 해수 및 강변 등에서 수영을 할 때는 꼭 안전모를 착용하세요.

첨부파일

 bbro.jpg (571 hit/ 173.5 KB) 

[미리보기](#)

[전체\(Zip\)다운로드](#)

목록

이전글

김대중 리더십 배우기 강좌 수강생 모집

다음글

해외여행시 전염병예방으로 건강한 여름을...

COPYRIGHT © MOKPO-SI. ALL RIGHT RESERVED.

MokPo - Si
Web Contents

