



Web Contents



2024년 04월 28일 13시 26분

뇌수막염

- 약품성분

- 주성분 : 헤모필루스인플루엔자 B형 올리고당-디프테리아 단백질 접합체
- 성상 : 백탁의 액체를 함유한 프리필드시린지

- 효능·효과

- B형 헤모필루스 인플루엔자 (뇌수막염) 예방

☑ 사용상의 주의사항

접종금지 대상

1. 이 약 성분, 특히 디프테리아 단백질에 과민성인 사람
2. 임부, 수유부 및 가임여성(안전성이 확립되어 있지 않다.)
3. 발열 또는 급성감염이 있는 환자

이상반응

1. 과민반응 : 드물게 두드러기와 같은 알레르기성 반응이 나타날 수 있다. 다른 어떤 종류의 알레르기가 있거나 다른 백신에 약물유해반응 경험이 있는 소아는 의사와의 상담이 필요하다.
2. 국소반응 : 접종 후 48시간 내에 주사부위의 홍반, 발적, 부종, 통증이 나타날 수 있다.
3. 전신반응 : 열, 발열과 자극감, 식욕부진, 구토, 설사가 나타날 수 있다.
4. 기타 : 드물게 아나필락시스반응을 포함하여 이 백신의 투여로 과민반응이 나타날 수 있으며 그 증상은 다음과 같다. 심각한 또는 중등도의 혈압강하, 심박증가나 감소, 피로, 비정상적인 쇠약감, 불안, 안절부절, 의식소실, 호흡곤란과 연하곤란, 가려움증(특히 손바닥과 발바닥), 혈관부종을 동반하거나 동반하지 않는 두드러기(특히 사지부위에서 붓거나 가려운 증상이 자주 나타나며 외음부와 안면부, 주로 입술부위와 눈부위에서 발생), 홍반(특히 귀주위에 발생), 구역, 구토, 복통, 설사 등이 나타날 수 있다.

MokPo - Si
Web Contents

