



Web Contents



2024년 04월 28일 08시 58분

일본뇌염(사백신)

- 약품성분

- 주성분 : 불활화 일본뇌염바이러스
 - 완충제 : 인산이수소칼륨, 인산수소나트륨 수화물
 - 등장화제 : 염화나트륨
 - 안정제 : 정제겔라틴
 - 현탁화제 : 폴리소르베이트 80
 - 보존제 : 치메로살
 - 용제 : 주사용수
- 효능·효과
- 일본뇌염의 예방

☑️ 사용상의 주의사항

접종금지 대상

1. 발열이 있는 자 또는 현저한 영양장애자
2. 심혈관계질환, 신질환 또는 간질환 환자로서 해당 질환이 급성기, 증악기 또는 활동기에 있는 자
3. 이 약의 성분에 의해 알레르기를 일으킬 우려가 있는 자
4. 이 약의 접종에 의해 이상한 부작용을 나타낸 일이 있는 자
5. 접종전 1년 이내에 경련증상을 나타낸 일이 있는 자
6. 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인
7. 기타 예방접종 실시가 부적당한 상태에 있는 자

이상반응

1. 뇌척수염 : 드물게 급성 산재성 뇌척수염이 나타난다. 보통 접종 후 수일로 부터 2주간 이내에 발열, 두통, 경련, 운동장애, 의식장애, 등이 나타남.
2. 국소의 발적, 종창, 동통, 또는 전신반응으로서 발열, 두통, 권태감, 발진 그 외에 오한, 어지러움, 근육통, 구역, 구토, 복통 등이 나타날 수 있으나 통상 2~3일 이내에 소실됨.
3. 국소의 소양감, 작열감 또는 전신반응으로서 무력감, 설사, 식욕부진, 보챔이 나타날 수 있음.

 예방접종 바로보기

MokPo - Si
Web Contents

