



목포시

Web Contents

2021년 09월 25일 14시 40분

심폐소생술 방법

1 환자를 눕힌 후 의식이 있는지 확인

2 근처 사람들에게 119를 불러달라고 요청

3 양손을 째끼어 손꿈치로 가슴중앙을 압박

4 어깨 힘으로 분당 100회 이상의 속도로 30회 시행

5 기도 확보

6 환자의 코를 막고 가슴이 올라올 정도로 공기를 불어 넣음

자동심장충격기(AED) 사용법

1 자동심장충격기(AED)를 심폐소생술에 방해가 되지 않는 위치에 놓은 뒤에 전원 버튼을 눌러 전원을 켜다.

2 패드1 : 오른쪽 빗장뼈 바로 아래 부착
패드2 : 왼쪽 젖꼭지 옆 겨드랑이 부착

3 "분석 중..." 이라는 음성 지시가 나오면 심폐소생술을 멈추고 환자에게서 손을 뺀다.

* 패드와 자동심장충격기 본체가 분리되어 있는 경우 연결하며, 패드 부착부위에 이물질이 있다면 제거한다.

* 자동심장충격기가 필요 없는 경우에는 "환자의 상태를 확인하고, 심폐소생술을 계속 하십시오" 라는 음성 지시가 나온다.



자동심장충격을 시행한 뒤에는
즉시 가슴압박과 인공호흡 비율을 30 : 2로
심폐소생술을 다시 시행한다.

* 자동심장충격기는 2분마다 심장리듬 분석을 반복해서 시행하며,
자동심장충격기 사용과 심폐소생술 시행은
119구급대가 현장에 도착할 때까지 지속



"쇼크 버튼을 누르십시오" 라는 음성 지시가 나오면
점멸하고 있는 쇼크 버튼을 눌러
자동심장충격을 시행한다.

* 쇼크버튼을 누르기 전에는 반드시
다른 사람이 환자에게서 떨어져 있는지 확인

[▶ 심폐소생술 및 \(자동\)심장충격기 사용법 영상 보러가기](#)

[▶ 응급의료포털, e-gen 홈페이지](#)

COPYRIGHT © MOKPO-SI. ALL RIGHT RESERVED.

MokPo - Si ***Web Contents***

