


노로바이러스

감염예방 수칙



식품의약품안전처



교육부



보건복지부



질병관리본부



“올겨울 **노로바이러스**가 다시 나타났어요.”

노로바이러스는 급성 위장염을 일으키는 바이러스입니다.

학교나 어린이집 등에서 **단체**로 걸리기도 합니다,

특히 **노인**이나 **어린이**들이 감염되기 쉽습니다



“(증세) 노로바이러스에 걸리면...”

노로바이러스 잠복기는 24~48시간 입니다.

심한 구역질과 구토, 설사, 복통, 오한, 발열을 동반하고
몸이 약한 노인이나 어린이는 목숨을 잃을 수도 있습니다.



“**노로바이러스**는 정말로 끈질겨요.”

건조한 상태에서도 20℃에서 3~4주간 죽지 않고,
60℃에서 30분 동안 가열해도 전염성이 남아 있어요.
그래서 꼭 85℃ 이상으로 1분 이상 가열해야 해요.


노로바이러스는 접촉만으로도 전파되기 때문에 특히 더 주의해야 해요.



“노로바이러스는 전염성이 굉장히 강해요.”

주변에 노로바이러스에 감염된 사람이 있으면,
음식물 뿐 아니라 접촉만으로도 전염될 수 있기 때문에
토사물을 깨끗하게 처리하고 환기도 시켜야 해요.

노로바이러스는 전염성이 강해요.
그렇기 때문에, 토사물을 청소할 때도
마스크와 에이프런을 꼭 사용해야 해요.



“특별히 주의해야 해요.”

환자가 토한 자리는 근처에 가거나 밟아서도 안되고
환자가 사용한 의자나 소지품 등을 만지지도 마세요.

“토사물을 처리할 때는 이렇게 하세요.”



반드시 장갑과 에이프런을 착용하세요



토사물은 천이나 종이를 이용해서
바깥에서 안쪽 방향으로 닦아야 해요.



사용한 천이나 종이는 비닐 봉투에 넣고
1000~5000ppm 염소소독액을 부어
소독하세요.

“토사물을 처리할 때는 이렇게 하세요.”



토사물이 있던 자리를 염소소독액
1000~5000ppm을 적신 천 등으로
덮어 소독액이 바닥에 스며들게 하세요.



장갑을 벗어 통에 담고 마찬가지로 같은
방법으로 염소소독액으로 처리한 다음



손을 깨끗이 씻어내세요.

살균 소독제 조제법(염소계)

액상 소독제				
구분	평상시(200ppm)	발생 우려시(1,000ppm)	사고 발생 후(5,000ppm)	비고
액 상	4% 이상 (유효염소농도) 제품 	250ml 	1,250ml 	10ℓ 제조시
	5% 이상 (유효염소농도) 제품 	200ml 	1,000ml 	

“토사물을 처리할 때는 ….”

절대로 맨손으로 구토물을 만지거나 대걸레로 닦지 말고,
1000~5000mg/L 염소소독액을 충분히 적셔 닦아야 해요.



“꼭 지켜주세요.”

손은 항상 깨끗이 씻으세요.

노로바이러스에 걸렸다가 나왔더라도 전염성이 있으므로
일주일 동안은 음식을 만들지도 마세요.



“올 겨울 건강하게 보내세요.”

겨울철에도 절대 안심할 수 없는 **노로바이러스!!!**

개인위생을 철저히 지키고 주변 환경을 깨끗이 관리해서
올 겨울 건강하게 보내세요. ^^